




Pastilla de Emergencia (PAE)



La pastilla o píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) también es conocida como píldoras “del día después”, “plan B” “de la mañana siguiente” o anticonceptivos poscoitales.



¿Cómo

actúa?

Las PAE evitan el embarazo y NO provocan aborto ya que funcionan impidiendo la ovulación y alterando la consistencia del moco cervical lo cual impide la entrada de espermatozoides a la cavidad uterina.

#AprofamTeCuida

Consulta al



SERVICIO AL CLIENTE

1586

WHATSAPP



2321-0033



Indicaciones de la pastilla de emergencia

¿Cuándo tomarlas?



- Lo antes posible después de la relación sexocital sin protección. Mientras más rápido se tomen hay más posibilidades de evitar el embarazo.
- Pueden prevenir el embarazo cuando se toman en las primeras 72 horas posteriores a la relación sexocital sin protección e incluso hasta el día 5.
- Si se tuvo relaciones sexuales los días después de la última menstruación sin usar un método anticonceptivo, es posible que esté embarazada y en ese caso las PAE no serán efectivas, sin embargo haberlas tomado no afectará al feto.

Eficacia

Muy alta cuando se toma en las primeras 72 horas después de la relación sexual sin protección. Su eficacia disminuye mientras más pase el tiempo.

Posibles efectos secundarios

En la semana después de tomar las pastillas de emergencia es posible que tengas:

- náuseas
- dolor abdominal
- fatiga
- dolor de cabeza
- dolor de mamas
- mareos o vómitos



▶ **Este método NO protege contra las ITS o el VIH/sida.**



Rompiendo mitos sobre la anticoncepción

- El anticonceptivo de emergencia NO provoca aborto.
- En caso de que no funcionen y se de el embarazo, las pastillas no afectan al feto.
- NO son peligrosas para la salud de la mujer pero deben usarse solo en caso de emergencia.
- NO provocan infertilidad a la mujer.

Los anticonceptivos de emergencia pueden ser usados por cualquier mujer, aún aquellas que no pueden usar métodos hormonales. La recuperación de la fertilidad después de tomar las PAE es inmediata.

Tomar las PAE solo previene el embarazo de actos sexuales ocurridos 5 días anteriores cuando se toma lo más pronto posible. Para mantenerse protegida de un embarazo, debes comenzar otro método anticonceptivo de inmediato.

Composición

Levonorgestrel 1.5 mg
Levonorgestrel 0.75 mg
Norgestrel 0.30 mg + etinilestradiol 0.030 mg (Lusia F)
Levonorgestrel 0.15 mg + etinilestradiol 0.030 mg (Microgynon®)

Dosis de acuerdo a la composición que se use

1 tableta en dosis única.
1 tableta cada 12 horas por 2 dosis.
4 tabletas lo más pronto posible y 4 tabletas 12 horas después.
4 tabletas lo más pronto posible y 4 tabletas 12 horas después.

Contacto directo:

#AprofamTeCuida

Consulta al



SERVICIO AL CLIENTE

1586



WHATSAPP

2321-0033