




ITS ¡Protégete!



Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se transmiten a través del contacto sexo genital con personas infectadas. Pueden ser producidas por una bacteria, un virus u otros agentes infecciosos que se encuentran en el líquido pre-eyaculatorio, el semen, el flujo vaginal y la sangre de una persona infectada.



¿Quiénes

podrían contagiarse?

Todas aquellas personas que tienen relaciones sexo genitales con una persona infectada sin el uso correcto y consistente del condón.

#AprofamTeCuida

Consulta al



SERVICIO AL CLIENTE

1586

WHATSAPP



2321-0033



Síntomas y tipos de Infecciones de Transmisión Sexual

Ante cualquiera de los síntomas siguientes acude a un chequeo médico.

Ulcerativas (Úlceras o llagas)

- Pequeñas ampollas o granos en los órganos genitales (algunos pueden ser dolorosos, otros no).
- Pueden también aparecer en boca, las manos, cara o el ano.
- Malestar, picazón o dolor en el área genital.
- Fiebre, piel escamosa, anemia.
- Pueden desaparecer en 1 o 2 semanas, pero reaparecerán otra vez si no se toma el tratamiento adecuado.

Tumorales (Abultamientos o verrugas)

- Diversos abultamientos, ampollas o verrugas como racimos o en forma de coliflor.
- Pueden o no ser dolorosos.
- Puede también aparecer en boca, área genital o el ano.
- Son causados por un virus. No obstante, la toma de medicamentos adecuados puede ayudar a reducir los síntomas o las molestias.
- En algunos casos, se hace necesaria la cirugía.

Secretadoras (Flujo anormal)

En mujeres



- Secreciones vaginales anormales.
- Picazón en vagina o vulva.
- Dolor o ardor al orinar.
- Sexo penetrativo doloroso.

En hombres



- Secreción blanquecina o transparente que no es semen.
- Orinar con frecuencia con dolor y/o sangre.
- Testículos dolorosos o hinchados.



¿Cuáles son las ITS más frecuentes?

Virus: VIH, herpes genital, papilomas y hepatitis B.
Bacterias: gonorrea, sífilis, chancro blando y clamidia.
Otros agentes como hongos y parásitos: candidiasis, tricomoniasis, ladillas y sarcoptosis.

El condón es el único método de barrera que nos protege de embarazos no intencionales y de infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH.

Forma correcta de utilizar el condón

- 1 Abre el condón por el lado dentado con cuidado para no romperlo. No uses tijeras, ni los dientes o las uñas para evitar romperlo.
- 2 Colócalo en la punta del pene erecto.
- 3 Aprieta la punta del condón para dejarlo sin aire y desenróllalo desde el glande hasta la base del pene, cubriéndolo totalmente.
- 4 Después de la eyaculación, retira el condón antes de perder por completo la erección. Recuerda ayudarte de papel higiénico para realizar este proceso.



- 5 Quita el condón y envuélvelo en un papel higiénico y deposítalo en un basurero. No lo dejes ir en el inodoro.



- 6 El condón se utiliza una sola vez. Si tienes una segunda relación sexogenital debes utilizar un nuevo condón.



Para evitar que se dañen tus condones líéalos en una condonera

Contacto directo:

#AprofamTeCuida

Consulta al



SERVICIO AL CLIENTE

1586

WHATSAPP



2321-0033